



25% 的结直肠癌患者有家族病史。
而 5% 的患者有遗传性疾病。

您的家族病史可能意味着您的结直肠癌风险增加。

有结直肠癌或某类息肉的家族病史意味着您应该在 45 岁之前开始结肠镜筛查。事实上，在您的直系亲属中已知最早的结直肠癌或息肉病例确诊前 10 年就应该开始筛查。

但不要止步于此。S 与您的家人分享结肠镜检查的结果。您的结直肠癌和息肉病史可能会影响您的家人的筛查方案和时间。

癌前病变息肉和早期结肠癌往往不出现任何症状。及时进行筛查是早期发现结直肠癌的关键，这时候也最容易治疗。

遗传性结直肠癌的类型：

- 林奇综合征，或遗传性非息肉病结肠癌 (HNPCC)
- “我们家族中是否有人患过结肠癌、直肠癌或任何其他类型的癌症？”

遗传性结直肠癌的类型：

- 林奇综合征，或遗传性非息肉病结肠癌 (HNPCC)
- 家族性腺瘤性息肉病 (FAP)
- MMYH 关联性息肉病 (MAP)

遗传咨询师可以帮助您评估您的家族病史以及让您知道它对您的结直肠癌风险而言意味着什么。然后他们可以指导您进行任何必要的步骤或基因测试。